

保健室便り



麻疹患者が増加しています！ MRワクチン2回目の接種はお済ですか？

No.134 2023年6月

桃山学院大学 保健室

「麻疹・風しんに関するワクチンは、2回接種が必要です」

- 麻疹ワクチンの種類は、①麻疹、風しん単独ワクチン、②MRワクチン(麻疹/風しん混合ワクチン) ③MMRワクチン(麻疹/風しん/流行性耳下腺炎混合ワクチン)があります。何れかのワクチンを2回接種する必要があります。現在は、MRワクチンが主流です。

- 麻疹は、空気感染する感染力の非常に強い病気で、マスクや手洗いでは感染防止することが出来ません。ワクチン接種が最も有効な感染予防方法です。罹患すると合併症にウイルス性脳炎、亜急性硬化性全脳炎(麻疹に感染後、数年から10年程経過して発症する脳炎で知能低下、けいれんなどが現れ、数年の内に死亡する)などの合併症があります。ワクチン未接種の乳幼児や、成人が麻疹に罹ると重症化することが多く、合併症を併発する率、死亡率も高くなります。麻疹に対する免疫がない場合、麻疹ウイルスに感染すると100%発病します。

麻疹ワクチンを過去に一回受けていて、抗体価が低下した人が麻疹に罹患すると、麻疹の典型的な症状を呈さないことも多く、全ての症状において軽症ですむようです。しかし、麻疹ウイルスを他者に感染させる危険性は同じです。

- 以下に該当する人は、早急にMRワクチンを接種するか抗体検査が必要です。(抗体検査を受けて陰性の場合にはMRワクチンの接種が必要になります)

- 過去に麻疹、風しんワクチンを受けたか不明。
- 麻疹か風しんかどちらに罹患したかわからない。
- 「麻疹、風しんワクチン」の接種を1回だけしか受けていない。

自分のワクチン接種歴を知りたい人は、母子手帳を調べてください、母子手帳には、今まで受けた予防接種歴が記載されています。母子手帳を紛失された方は、所轄の市役所(区役所)で接種履歴を確認できます。



♥ 不安なこと、解らないことがあればいつでも保健室へお尋ねください。